

Observations sur le Trepan dans l'épilepsie occasionnée par cause — Externe —

À la lecture des profonds mémoires de Messieurs
Quesnay et Lویی, sur les maladies de la tête, insérés
dans les Savés dépôts de la Chirurgie, il semble que
tous les accidents qui doivent déterminer à l'opération
du Trepan sont dévoilés, cependant la nature enfante
encore tous les jours des phénomènes si extraordinaires
que l'œil observateur ne cessera d'être éclairé par la
Découverte.

Pour que l'observation concoure à la richesse de l'art,
elle doit être décorée de toutes les circonstances qui caracté-
rissent son sujet: Dans cette vue, je vais entrer dans le
détail des symptômes relatifs à celle que j'ai l'honneur
de présenter.

Dans le mois de may 1771. une fille âgée de douze ans
tomba à la renverse d'environ six pieds de haut; elle
resta sans connoissance l'espace d'un quart d'heure, à
son réveil, elle ressentit une douleur violente dans le
front et dans la joue gauche, le lendemain de la
chûte, il se manifesta une tumeur de la grosseur d'un
œuf de poulette au milieu du front, la malade fut saignée

Du bras es du pied, on appliqua sur la tumeur les res-
-lutifs convenables, à la faveur de ces suors la tumeur
parus diminuer, mais dix jours après la chute, un
cercle noirâtre se forma au tour des orbites, l'echymose
devint si Considerable que toute la face, et même jus-
-qu'à la moitié de la poitrine devinrent d'un noir
Ethiopien.

Quinze jours après L'apparition de cette Echymose
la couleur noire s'effaca peu à peu, le visage es la
poitrine reprirent leur blancheur naturelle, mais la
couleur ~~mutab~~ blanche de ces parties ne subsista
que quinze jours, car alors la tumeur qui avoit
un peu diminué augmenta; es le mal de tête qui
avoit toujours été violent depuis le moment de la chute
augmenta, en consequence de L'augmentation de la
tumeur, L'éclypse qui s'étoit évanouie cerna de
nouveau les orbites, reparus avec la même violence qu'
à la première fois, es dura aussi le même espace de
temps, au bout duquel elle s'évanouie encore pour être
remplacée par la couleur naturelle, ce Changement
alternatif du noir au blanc es du blanc au noir
joua ce rôle de quinze en quinze jours pendant
l'espace d'un an, cependant sur la fin la couleur de
la peau loin d'être d'un noir Ethopien, n'étoit plus
que d'une couleur mutabre, enfin les Echymoses
disparurent entièrement, mais la tumeur subsista
toujours, tantôt plus, tantôt moins volumineuse es
la douleur de tête augmentoit es diminuoit suivant
le volume de la tumeur, après deux ans d'augmenta-
-tion es de diminution, la tumeur parus se terminer
par induration es son volume approchoit alors de
celui d'une noisette

Quoique le mal de tête fût moins violent que dans le commencement, il l'étoit pourtant toujours assez pour empêcher la malade de faire beaucoup d'exercice, car quand elle se baïssoit, il lui sembloit que sa tête alloit tomber par terre.

Quand la douleur de la tête étoit à son plus haut degré, les nausées étoient de la partie, les yeux s'enflammoient et il sortoit quelque fois du sang par l'oreille gauche, le sommeil étoit interrompu et de peu de durée, l'appétit étoit si éteint que la malade ne mangeoit que par raison, quoique le sommeil et l'appétit fussent dérangés, la nature ne travailla pas moins à l'éruption des règles qui à l'avorte, ne paroissoient pas dans des périodes égales, car il se passoit souvent plusieurs mois sans apparition.

La Malade avoit éprouvé pendant deux ans toutes les variations dont je viens de faire l'énumération et c'en fut qu'à cette époque qu'elle me consulta, mais n'ayant point encore d'exemple d'une chute dans les effets fâcheux de Comptiquès, j'implorai les lumières de cet illustre praticien qui par ses sublimes écrits éclaire notre siècle. M.^r Louis me fit l'honneur de me répondre de la manière la plus satisfaisante, espérant que je consultai les profonds mémoires de M.^r Quesnay sur le trepan dans les cas douteux. à la lecture des savantes recherches du premier secrétaire de l'Académie je fus encouragé par les heureux succès qui avoient été les suites des différentes tentatives des autres, presque convaincu que l'altération de l'os entretenoit toujours la tumeur, je conseillai à la malade une incision pour



Examiner l'état du crâne, mais ne souffrant que médi-
-ocrement alors, elle fut mis à ma proposition, espérant
que le temps pourroit faire totalement disparaître les
accidents, les espérances furent vaines, car dans le mois
de novembre 1844. trois ans et demi après la chute
la tumeur qui avoit paru se terminer par induration
devint plus volumineuse, le mal de tête augmenta
beaucoup, les douleurs parurent même plus vives
tant au siège de la tumeur qu'à la partie diamétrale.
opposée qui suivant toutes les apparences étoit le lieu
où la tête avoit été frappée lors de la chute et qui
avoit été indolore jus qu'à alors.

La tumeur du front qui n'étoit produite que par le
contre coup parut noire et molle dans son centre et
dure dans sa circonférence, les douleurs de tête étoient
si excessives que la malade ne pouvoit reposer sur
son oreiller, en marchant elle ressembloit à chaque
pas au derrière de la tête des secousses semblables à
des coups et elle étoit souvent frappée de vertiges ten-
-dant jusqu'à être renversée par terre, elle soutint
cet état pendant trois mois, mais à la fin Craignant
des suites encore plus funestes, elle vint me prier de
lui faire l'incision, contre laquelle elle étoit autre
fois si revoltée.

Le 22. Janvier 1845. j'incisai la tumeur depuis la
racine des Cheveux jusqu'à la partie inférieure du
Coronal, j'en suis de bien débarrasser le pericrâne,
pour observer l'état de l'os que je trouvai très sain,
les petits coups portés avec la sonde, ne faisoient
point sentir leur impression à l'endroit frappé,

mais ils ex citoient une sensation tres vive à l'occipus,
et la douleur devint si excessive dans ces endroits que le
26. il se manifesta des convulsions dont le quclude
etoit singulier.

La malade ressentoit des battemens dans la playe
et dans l'occipus, ces battemens estoient suivis de treme-
-ments d'oreilles et d'ebloissemens, le globe de la main
-gauche s'engourdissoit, ce engourdissement se com-
-muniqueoit à la main, à l'avant bras, et quand il
etoit parvenu au coude, un frisson spasmodique se
faisoit sentir par tout le corps, et alors les convul-
-sions s'emparoient de tous les membres, le visage
conservoit sa serenité, il estoit seulement un peu
plus vermeil qu'à l'ordinaire, Les muscles du cou
etoient souvent en convulsion, tout le corps tomboit
dans un etat si tonique qu'on pouvoit le regarder
comme Cataleptique, car les membres restoient
dans la position ou on les mettoit. Les ayes con-
-vulsifs ouz en pendant huit jours, des peries si
regliées qu'ils paroissoient se finissoient à la même
minutte, ils durent constamment trois heures,
quand l'aye étoit passé, la malade se portoit assy
bien, sans aucune connoissance de son état, la
Douleur du devriere de la tête subsistoit toujours
et tous les objets paroissoient sous une couleur d'un
bleu celeste, mais à l'approche de l'aye ils paroiss-
-soient noirs, en outre sous le Crâne vers l'occipus
qui estoit le centre d'ou partoient les douleurs, la malade
croire resentoit un balottement semblable à celui
qu'on occasionne une liqueur flottante dans un vase à
demi plein.



Attribué à la marche d'une maladie qui offroit des sym-
-ptomes si variés, je ne voulus prendre aucun parti,
sans auparavant avoir demandé l'avis d'un des Soixante
de cette illustre compagnie pour les travaux sous-sous
cesse consacrés à la conservation de l'humanité.
M. Sabatier eût la bonté de m'aider de ses conseils
qui étoient conformes à ceux que M. Louis m'avoit
précédemment donnés, je disposai tout pour l'opéra-
-tion du Trepan. Le 11. février 1775. je fis une incision
Cruciale par laquelle je découvris la partie posté-
-rieure des parietaux, et la partie supérieure de l'occipital;
Les os parietaux foras sains, mais les Tegumens étoient
un peu œdemateux, trois jours après l'incision la ma-
-lade déclara qu'elle voyoit l'opération du trepan inutile,
attendu que tous les symptômes avoient disparu, et
qu'elle ne ressentoit plus ce balottement semblable
à une liqueur flottante qui étoit celui qui paroïssoit
Le jour du Trepan pour l'opération. à la levée de
l'appareil parut une production carnie forme
de la grosseur d'un grain de raisin noir située sur
l'angle supérieur et postérieur du parietal gauche.
Dans l'endroit parallèle de l'autre parietal, il sortoit
une production semblable à une corde de violon
de la longueur de deux pouces, et d'une sensibilité si
exquise qu'on ne pouvoit la toucher, sans que la ma-
-lade redonnât des signes de la douleur la plus vive.
En examinant ces productions, elles paroissent être des
filôts de communication de la dure mere au
pericrâne qui passent à travers les trous parietaux.
Des plumaceaux trempés dans l'huile de Theriacale.

fixeurs évacuer ces productions; Soir par le degorgent
des vaisseaux qui passent à travers les sutures, Soir
par le débordement du péricrâne. La malade fut
environ quinze jours après l'incision cruciale sans
ressentir de fâcheux accidents, cependant à chaque
pas qu'elle faisoit, elle restait toujours en battement,
dans une peine fixe; au bout de ces quinze jours,
la tranquillité apparente fut bien tôt troublée par
de nouvelles attaques d'épilepsie qui paroissoient
constamment deux fois par jours et aux mêmes
heures,

La malade soutint encore pendant quinze jours
ces attaques, sans se décider pour le Trepan, mais
le 17. de mars, un mois après l'incision, il survint
une auge d'épilepsie et de Cataplexie si violente qu'il
dura plus de trente six heures. Craignons alors pour
la vie de la malade. Le 18. en présence de deux mede-
cins et de quatre Chirurgiens, j'appliquai une Couronne
de Trepan au lieu qui avoit constamment paru
douloureux depuis environ cinq mois; dès que la
pièce d'os fut enlevée, on reconnut une tumeur si
considérable de la dure mère qu'au premier abord
on la jugea cartilagineuse, mais on fut bientôt dé-
trompé, car elle se ramollit tellement qu'elle s'engagea
dans le trou, comme si elle eût été attirée par
l'effort d'une ventouse; à l'instant, j'obturai le trou et
fis une légère compression pour réprimer la dure
mère qui s'exfolia au bout de quinze jours, et

11
Mars



la cicatrice des teguments se fit au bout de trois mois.
Le succès de cette opération a été des plus heureux, car
dès que la pièce d'os fut enlevée, l'épilepsie et la Cata-
lepsie disparurent, la malade recouvra sa con-
science et depuis elle n'a eu aucun symptôme qui eût
trait à l'épilepsie, et jouir actuellement d'une bonne
santé.

Comme j'ignore le degré de tension de la dure mère
dans l'état de santé, et ne pouvant le reconnaître sur
l'homme, j'ai pris le parti de trepaner un chien
pour comparer sa dure mère avec celle de la malade.
J'observai dans l'animal une tension souple et élastique,
la dure mère cédoit à la pression du doigt et revenoit
dans son état sans dérangement, d'où je jugeai que
la tension de la dure mère de la malade étoit contre
nature, mais cette tension étoit elle cause d'épilepsie
ou l'épilepsie produisoit elle la tension, j'ignore.

Dans le cours du traitement il s'est encore offert
des circonstances assez singulières; dès que j'eus
fait l'incision du feutre, l'os parut insensible, mais
six jours après il devint d'une si grande sensibilité
que la seule application de la main sans percussion
faisoit pousser des cris à la malade.

En observant l'état du Coronal, j'aperçus qu'il étoit
mobile, et je crus que la nature avoit travaillé
à l'exfoliation d'une pièce d'os. La 30.^e observation
du mémoire de M. Quesnay dans le cas d'ontoux

du Trepan, m'autorisoir à y porter un ypareil yproquois.
Daus le dessein d'oter la piece exsolice, j'appliquai
le tire-fond, mais tout le Coronal étoit enoble
es ou pouvois yporter es os en haut, en bas, es
sur les côtes, à ces différents mouvements, la malade
entendoir un bruis semblable à celui qui emane
de deux tés de ypot cassé, ce bruis se faisoit encore
entendre à certains mouvements quoique la Cicatrice
du front soit bien consolidée.

Seconde observation

un jeune homme agé d'environ seize ans tomba d'un
arbre, resta un moment sans connoissance, es m se
relevant sentit une douleur assés vive sur la partie
gauche du Coronal, sans contusion apparente
il negligea de se faire saigner, quoique la douleur fut
toujours permanente; un an après la Chute il fut
frappé d'auy epileptiques, sa famille effrayée
consultata sa maladie, on administra sans succès
tous les antispasmodiques, es deux ans après la
chute on se libora d'appliquer le Trepan sur la lieu
douloureux; Le malade se yrieta au ouvrage
sous l'instrument, es quoique l'on ne trouva rien sous
le Crâne, il joit actuellement d'une meilleure santé
es nia de clari n'être plus sujet aux auy epileptiques.



Troisième observation

une dame tomba de Cheval le jour de ses nocces,
sa tête porta violemment sur le gravé, elle se releva
sur le Champ un peu étourdie, sans faire attention
aux suites qui pouvoient résulter d'un pareil accident,
mais de temps en temps, elle ressentoit des douleurs sur
la partie postérieure du parietat gauche, elle devint
en suite, et sa grossesse ne fut point troublée; sa
coulée arrivée un an après sa Chute fut assez
heureuse, elle en eut encore deux autres de même,
en fin environ quatre ans après sa Chute, dès qu'elle
buvoit quelque liqueur spiritueuse, elle ressentoit
des si vives douleurs à l'endroit frappé qu'elle ne
pouvoit retirer ses Cris. elle éprouva sans succès toutes
les ressources de la médecine, et trois mois après
sa mort, on s'aperçut que ses facultés intellectuelles
étoient dérangées, son inattention aux choses qui l'in-
téressoient firent craindre qu'elle ne tombât dans
l'imbécillité, mais elle tomba dans des accès Epilep-
tiques qui étoient précédés par l'engourdissement
des mains, et quand elle étoit dans l'aveugle visage
conservant la sensibilité, elle mourut dans un de ces
accès, à l'ouverture du cadavre, à l'endroit frappé
ou les douleurs étoient toujours fait sentir, on
trouva la dure mère d'une couleur brune de la
langue d'un liard et plus épaisse qu'ailleurs.
Le médecin qui la toujours gouvernée dans sa maladie

m'a avoué qu'il n'avoit jamais eu l'idée du trepan
ne soupçonner pas qu'une chute d'ur l'époque étoit
de quatre ans sur qu'il produiroit tout le débordement
depuis l'heureux succès d'opération du trepan
de la première observation, il voit qu'on n'eût pu
la pratiquer avec succès à sa malade.

Observation sur un bec
de lièvre guéri par le moyen des
cantarides et d'un bandage unissant.
Dans le mémoire sur le bec de Lièvre inséré
au quatorzième volume des mémoires de l'Académie
royale de Chirurgie page 13. M^r Louis dit qu'il
est persuadé qu'il y a beaucoup de bcs de lièvre
qu'on pourroit guérir, en usant primitivement
des Cantarides, au lieu d'incision, que cette voy
donneroit un nouveau prix aux procédés chirurgi-
= caux, pour la guérison d'une difformité que la
= crainte de l'opération porte bien des gens à con-
= server toute leur vie.

Pour confirmer ce prospectus, j'ai cru devoir
communiquer l'observation suivante.

En 1768. je rencontrai par hazard une fille
de dix huit ans qui portoit depuis sa naissance
un bec de Lièvre simple; la lèvre supérieure
étoit fendue jus qu'à l'aile gauche du nez; je
demandai à cette fille si elle ne seroit pas bien aise



de n'avoir plus cette difformité, elle répondit qu'elle ne se décideroit jamais à souffrir d'opération donc elle croyoit le sucré inévitable, qu'elle avoit bien vécu jus qu' alors avec la levre fendue, et qu'elle mourroit de même.

Je lui proposai de la guérir sans la couper ni la coudre, et lui promis qu'elle ne seroit pas long temps sans en guérir. ma proposition l'étonna d'abord, mais si je réfléchis sur elle, elle dit que si je lui tenois parole, qu'elle ne refuseroit pas mon offre, mais qu'au paravous elle voudroit savoir comment je m'y prendrois pour réunir sa levre sans la couper ni la coudre. Je lui expliquai mon dessein et elle se décida.

Je mis de Longueval épi pastique sur un linge que je roulai mollement pour former un cylindre de la grosseur d'un tuyau de plume, je garnis les deux côtes de la levre de deux petites emplâtres de diachylon gommé, je saupoudrai le cylindre de poudre de cantaride, je l'appliquai et le soutins au moyen du bandage unissant, j'élevai mon appareil au bout de 18. heures, l'épiderme se détacha facilement, je rapppliquai le bandage unissant, et le laissai quatre jours sans le lever, l'agglutination des bords paroissoit déjà solide mais pour plus de sûreté, je laissai encore le bandage six jours de plus, je ne pensai nullement à l'oplayer et le sucré à répondre par faittement à mes desirs.

Je suis encore sur le point de faire une
pareille tentative sur un homme de 26 ans -
que la crainte de l'opération a toujours retenu

— Pujoubault Maître en Chirurgie.
à Avranches Le 6 janvier
1776



